

患者ID:@PATIENTID

2015.1.19作成

@PATIENTNAME 様 血液化療悪性リンパ腫 CHOP

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_Dc	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m2

(DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩液500mL	ルートキープ	点滴	
②	アロキシ1V 生食50mL	30分	点滴	
③	生理食塩液 50mL アドリアシン注用 50mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	15分	点滴	
④	生理食塩液 50mL オンコビン注射用 1.4mg/m ² ()mg/body 最小単位0.1mg 最大2mgまで #VALUE! 計算値	15分	点滴	
⑤	5%糖液 250mL 注射用エンドキサン 750mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	
⑥	プレドニン錠 60mg/m ² 2×朝・昼食後 ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値		5日間内服	5日間内服

投与手順



スケジュール



・オンコビン、アドリアシン起壊死性抗がん剤であるため、確実にルート確保を行い、注射部位の症状に注意する。

- ・血管痛が出現した場合は、温療法やデカドロン注の追加を検討すること。
- ・アドリアシンは重篤な心筋障害の報告があるため定期的な心電図、心エコーを実施すること。
- ・オンコビンによる便秘が発現する可能性あり。

参考資料

最新化学療法レジメン-血液腫瘍-
血液内科レジデントマニュアル