

患者ID:@PATIENTID

2009.4.10作成

@PATIENTNAME 様 大腸化療(アバスチン+FOLFIRI)

2012.4.24改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

(DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセトロン3mgバッグ1V デカドロン3. 3mg2A	30分	点滴	
②	アバスチン 5mg/kg+生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	
③	トポテシン 150mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	90分	点滴	
④	レボホリナート 200mg/m ² 5%糖液100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑤	5FU 400mg/m ² ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	5分	点滴	
⑥	5FU 2400mg/m ² +生食を加え全量を230mL (処方生食500mL) ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	46時間 インフューザー ポンプで	点滴	

内服

トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)

炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)


ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)

カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)


ロペミン1C1×下痢時

半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

投与手順



スケジュール



効果

アバスチン併用FOLFIRI療法の臨床第2相試験(AVIRI)

前治療歴の無い転移性結腸・直腸癌患者 n = 209

全奏効	111 (53.1%)
CR	7 (3.3%)
PR	104 (49.8%)
SD	68 (32.5%)

副作用

グレード3/4の有害事象 n=209

出血	3.80%
高血圧	3.80%
蛋白尿	2.40%
動脈血栓塞栓症	4.80%
消化管穿孔	2.40%
創傷治癒合併症	0.50%

引用 Sobrero, et al. ASCO 2007