


指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_D	cm
コース数		体重	HEIGHT01_E	kg
		体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	プレドニゾロン5mg 2錠2×朝昼食後	朝昼食後	内服	連日内服
②	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴	
③	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 2A ボララミン注1A	30分	点滴	
④	生理食塩水100mL ファモチジン 1A	30分	点滴	
⑤	5%糖液250mL ジェブタナ 20mg/m2 ( )mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用

投与手順




スケジュール

3週1回投与する  
内服



注射



注意

アルコール入り、抗ヒスタミン薬使用であるため、運転は不可  
FN発症率が高いため、ジューラスタの投与を考慮する。

副作用

- 国内第 I 相臨床試験
- 好中球減少(Grade3以上) 100%
- 貧血(Grade3以上) 25%
- 白血球減少(Grade3以上) 95.5%
- 血小板減少(Grade3以上) 6.8%
- 疲労 54.5%
- 悪心 47.7%
- 下痢 45.5%