

患者ID:@PATIENTID

2010.6.25作成

@PATIENTNAME 様 大腸化療(ベクティビックス)


2012.2.7改訂

指示者	@USERNAME	身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
コース数		体重	WHEIGHT01_Do	kg
		体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩液 500mL	ルートキープ	点滴(末梢) 初回のみ	初回のみ
②	ポララミン注 生食50mL	15分	点滴 初回のみ	初回のみ
③	ベクティビックス 6mg/kg 生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用


投与手順



注意

インフュージョンリアクション発現時の対応のため、初回のみ末梢ルートを確認する。

スケジュール



副作用発現

ざ瘡 65%	低Mg血症 28%	下痢 15%
皮膚乾燥 60%	疲労 26%	嘔吐 15%
発疹 55%	口内炎 25%	紅斑 13%
掻痒 42%	食欲不振 20%	
爪周囲炎 35%		

臨床試験成績(国内第2相試験:20050216試験)

*追跡期間中央値26.1週(5.4-42.0週)

奏効率 13.5%

奏効期間 16.2週

PFS 8.0週

OS 9.3月