

患者ID:@PATIENTID

@PATIENTNAME 様 血液化療悪性リンパ腫 リツキサンの投与


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)

実施印
day1 day2

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生理食塩液500mL	ルートキープ	点滴		
②	アロキシ1A 生食50mL デカドロン注(3.3mg)1A	30分	点滴		
③	ロキソプロフェン 1錠		内服		
④	レスタミン錠5錠		内服		
⑤	トリアキシ注 90mg/m2 生食250mL 注射用水20mL3~4A(トリアキシ調製用) ()mg/body #VALUE! 計算値	60分	点滴		
⑥	リツキサン375mg/m ² 生食500mL(リツキサンを1mg/mLに調製する) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	【初回】 50mL/hで開始、30分ごとに50mL/hずつ増加、最大400mL/hまで可能 【2回目以降】 100mL/hrで開始、30分ごとに100mL/hずつ増加、最大400mL/hまで可能	点滴		

投与手順



スケジュール



注意事項

血管痛を起こしやすい。適切な静脈の選択を行う。ルートキープの生食500mLの速度を速め希釈させる、温罨法を用いる等の対応を行う
上記でも対応困難な場合は中心静脈ポートを行う。
発熱発現時はカロナール等での対応を行う。
トリアキシは調製後3時間以内に投与する必要がある。