

@PATIENTNAME 様

大腸化療(アバスチン+sLV5FU2)

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_Dc	cm
体重	WHEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

(DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセトロンバッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴	
②	アバスチン 5mg/kg 生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	点滴	
③	レボホリナート 200mg/m ² 5%ブドウ糖100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	2時間	点滴	
④	5FU 400mg/m ² ()mg/body #VALUE! 計算値	5分	静注	
⑤	5FU 2400mg/m ² +生食を加え全量を230mL (処方生食500mL) ()mg/body #VALUE! 計算値	46時間	インフューザー ポンプLV5に 入れて全量を 230mLに調製	

投与手順



注意

副作用が強い際は、原則80%量で、その時はレボホリナート、アバスチン減量の必要なし。
アバスチン投与後は頻回に血圧測定を行う。
原則として手術後28日以内の投与は不可。

副作用

+アバスチンでの特徴的な副作用
消化管穿孔1.7%、創傷治癒遅延、出血3.7%、動脈血栓症1.5~9%、静脈血栓症9.4%
高血圧性脳症・高血圧クレーゼ3.2~15%

スケジュール

