

患者ID:@PATIENTID

2009.7.10作成

@PATIENTNAME 様

非小細胞肺化療(ドセタキセル)


2012.2.8改訂

指示者	@USERNAME	身長	#HEIGHT01_D	cm
コース数		体重	#WEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路
①	グラニセロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴
②	5%糖液250mL ドセタキセル 60mg/m2 ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	60分	点滴

投与手順



スケジュール



注意

アルコールが入っているため、車の運転は控える。
アルコール過敏症の患者さんには5%糖液で溶解し、調製。

薬価
BSA1.5の場合
1回 92,000円

治療成績と副作用(海外の第Ⅲ相試験75mg/m2,N=125,Fossella FV,et al)

MST	5.7ヶ月
1年生存率	47.70%
奏効率	32.00%

	Grade3	Grade4	G3以上の割合
白血球減少	66	3	46%
好中球減少	59	53	74%
ヘモグロビン減少	15	0	10%
悪心・嘔吐	13	0	9%