

患者ID:@PATIENTID

2009.11.13作成

@PATIENTNAME 様

肺化療(ジェムザール+パラプラチン)

2012.11.21改訂


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm	
体重	HEIGHT01_I	kg	
体表面積	#VALUE!	m ²	(DuBois式)
年齢		歳	
性別			
血清クレアチニン		mg/dL	
Ccr		mL/min	(Cockcroft&Gault式(+0.2補正))


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生食500mL	ルートキープ	点滴		
②	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴		
③	パラプラチン AUC5 生食 250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	60分	点滴		
④	ジェムザール 1000mg/m ² 生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	30分	点滴		


投与手順
day1



day8



スケジュール



day8の時は血小板の値に要注意、特に7.5万/ μ Lを下回る場合や、治療前よりも急激な減少が認められた場合は要注意

yamamotoの報告によれば、Grade3以上の血小板減少が81.3%でありの症例に血小板輸血を実施 癌化学療法ハンドブック2009 p74参