

患者ID:@PATIENTID

@PATIENTNAME 様

大腸化療（アバスチン+ロンサーフ療法）

2018.6.30作成

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m2

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day15
①	ロンサーフ ( )mg/body2× 朝( )mg 夕( )mg #VALUE! 計算値(1日量) <small>右下の表を参照</small>	5日間投与2日間休薬(2週間繰り返し)(day1-14)	内服	ロンサーフ服用開始(5日間投与2日間休薬を2週間繰り返し、3-4週は休薬)	
②	アバスチン 5mg/kg+生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 <small>最小単位10mg</small>	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴		


投与手順

day1. 8

ロンサーフ内服開始(5日間投与2日間休薬を2週間繰り返した後、16日間休薬)

右の表を参考にして下さい。



day1. 15



【ロンサーフ投与量】

体表面積(m <sup>2</sup> )	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1.07未満	35mg/回(70mg/日)
1.07以上~1.23未満	40mg/回(80mg/日)
1.23以上~1.38未満	45mg/回(90mg/日)
1.38以上~1.53未満	50mg/回(100mg/日)
1.53以上~1.69未満	55mg/回(110mg/日)
1.69以上~1.84未満	60mg/回(120mg/日)
1.84以上~1.99未満	65mg/回(130mg/日)
1.99以上~2.15未満	70mg/回(140mg/日)
2.15以上	75mg/回(150mg/日)

スケジュール



【副作用時の減量方法】

前コース(休薬期間を含む)中に好中球数 500/mm<sup>3</sup>未満・血小板数 50,000/mm<sup>3</sup>未満に該当する有害事象が発現した場合には、本剤の投与再開時において、コース単位で1日単位量として10mg/日単位で減量する。ただし最低投与量は30mg/日までとする。

【文献・エビデンス】

phase I / II 症例数: 25例

主要評価項目: 判定による16週後の無増悪生存割合 60%

PFS:3.7か月 OS:11.4か月

Kuboki Y, et al. Lancet Oncol