

患者ID:@PATIENTID

2009.4.10作成

@PATIENTNAME 様 大腸化療FOLFIRI

2012.2.7改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセロン3mgバッグ1V デカドロン3.3mg2A	30分	点滴	
②	トポテシン 150mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! <small>計算値 最小単位10mg</small>	90分	点滴	
③	レボホリナート 200mg/m ² 5%糖液100mL ()mg/body #VALUE! <small>計算値 最小単位10mg</small>	120分	点滴	
④	5FU 400mg/m ² ()mg/body #VALUE! <small>計算値 最小単位10mg</small>	5分	点滴	
⑤	5FU 2400mg/m ² +生食を加え全量を230mL (処方生食500mL) ()mg/body #VALUE! <small>計算値 最小単位10mg</small>	46時間 インフューザー ポンプで	点滴	


トポテシンの副作用(下痢)が懸念される場合は以下の内服も考慮

- ブスコパン3錠3×1日分(1日目)
- 炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)
- ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)
- カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)
- ロペミン1C1×下痢時
- 半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

投与手順



スケジュール



臨床成績

V303試験

FOLFIRI VS civ5FU/LV

	奏効率	TTP	MST
FOLFIRI	34.80%	6.7ヶ月	17.4ヶ月
civ5FU/LV	21.90%	4.4ヶ月	14.1ヶ月

奏効率

化学療法未治療の切除不能転移・再発大腸癌：56%（海外）
無増悪生存期間中央値

化学療法未治療の切除不能転移・再発大腸癌：8.5ヶ月^{*}
生存期間中央値

化学療法未治療の切除不能転移・再発大腸癌：17.4-20.1ヶ月^{**}

^{*}Christophe Tournigand: FOLFIRI Followed by FOLFOX6 or the Reverse Sequence in Advanced Colorectal Cancer; A Randomized GERCOR Study, Journal of Clinical Oncology, Vol22, 2004

^{**}Alan Venook: Critical Evaluation of Current Treatments in Metastatic Colorectal Cancer, The Oncologist, 2005; 10 : 250-261