

患者ID:@PATIENTID

2009.5.12作成

@PATIENTNAME 様


乳化療(Weeklyパクリタキセル+HER)

2012.5.24改定


| | | | | |
|------|-----------|------|------------|---------------|
| 指示者 | @USERNAME | 身長 | HEIGHT01_D | cm |
| コース数 | | 体重 | HEIGHT01_D | kg |
| | | 体表面積 | #VALUE! | m2 (DuBoisの式) |

実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|--|-----------------|------|---------|
| ① | 生理食塩水500mL | ルートキープ | 点滴 | |
| ② | レスタミンコーワ5錠 | | 内服 | |
| ③ | グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 3A | 30分 | 点滴 | |
| ④ | 生理食塩水100mL ガスター 1A | 30分 | 点滴 | |
| ⑤ | 5%糖液250mL パクリタキセル 80mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 | 60分 | 点滴 | フィルター使用 |
| ⑥ | 生理食塩水250mL ハーセプチン 4mg/kg(初回のみ) ハーセプチン 2mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降 | 90分 2回目から30分 | 点滴 | |



スケジュール 毎週1回投与する



薬価
BSA1.5、体重50kgの場合
初回は16万円
2回目以降は12万円

注意

HER2陽性患者のみ使用可

心エコーで心駆出率50%以上

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意(初回投与の40%に発現、0.3%にアナフィラキシーショック)

パクリタキセル使用時には必ず、フィルターを使用する。

パクリタキセルはアルコールが入っているため、車の運転は控える。

治療成績

奏効率は57-62%(癌研究会有明病院最新化学療法レジメンより)

無進行期間は15ヶ月