


@PATIENTNAME 様 乳化療(FEC75)

指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm
コース数		体重	HEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day2
①	ヴィーンF	ルートキープ	点滴		
②	アロキシ1V デカドロン3.3mg 3A 生食100mL	30分	点滴		
③	生理食塩水50mL ファルモルピシン 75mg/m2 ( )mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	15分	点滴		
④	5%TZ 250mL エンドキサン注 500mg/m2 ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	30分	点滴		
⑤	生理食塩水50mL 5-FU 500mg/m2 ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	5分	点滴		
⑥	イメンド1セット(day1~3まで内服)		内服		
⑦	デカドロン(0.5mg)8錠×朝昼食後3日分 day2-4		内服		day2-4に服用

③の投与1時間前までにイメンドのday1を服用



スケジュール  
3週1回投与し、4サイクル繰り返す



注意

- ・ 上記治療は4クール行う。
- ・ 38℃以上の発熱が認められた場合には、クラビット内服を開始する。
- ・ 尿や汗が赤くなることがあります。
- ・ 血管外に薬液がもれると、炎症や壊死が起こることがあります。