

患者ID:@PATIENTID

2018.4.13

@PATIENTNAME 様

乳化療(4Weeklyハーセプチン+Weeklyパクリタキセル)

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |

| | | | |
|------|---------|----|------------|
| 身長 | #VALUE! | cm | |
| 体重 | #VALUE! | kg | |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 | (DuBoisの式) |


実施印

day1 day8 day15


| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | | | |
|---|---|----------------------|------|---------|---------|---------|
| ① | 生理食塩水500mL | ルートキープ | 点滴 | | | |
| ② | レスタミンコーワ5錠 | | 内服 | | | |
| ③ | グラニセトン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg3A | 30分 | 点滴 | | | |
| ④ | 生理食塩水100mL ファモチジン 1A | 30分 | 点滴 | | | |
| ⑤ | 5%糖液250mL パクリタキセル 80mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 | 60分 | 点滴 | フィルター使用 | フィルター使用 | フィルター使用 |
| ⑥ | 生理食塩水250mL ハーセプチン 8mg/kg(初回のみ) ハーセプチン 6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降 | 初回90分 2回目以降30分でも可 | 点滴 | | | |

投与手順


day1



day8,15



スケジュール



注意

HER2陽性患者のみ使用可

| | |
|------|---|
| 選択基準 | ベースラインのLVEF $\geq 50\%$ |
| 除外基準 | コントロール不良の高血圧 (Bp150/100以上) 不安定狭心症 うっ血性心不全の既往 治療を要する重篤な不整脈 (心房細動、発作性上室性頻脈を除く) 6か月以内の心筋梗塞 術前/術後療法でのハーセプチン投与中または投与後にLVEF $< 50\%$ |

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意