

患者ID:@PATIENTID

2010.07.19作成

@PATIENTNAME様

乳化療(GT療法)

2012.5.24改定

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	\$HEIGHT01_Doc	cm	
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg	
体表面積	#VALUE!	m2	(DuBoisの式)

実施印


day1 day8

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day8
①	5% ブドウ糖液 250mL	ルートキープ	点滴		
②	レスタミンコーワ 5錠		内服		
③	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 5A	30分	点滴	Day1	
④	グラニセトロン3mg 1バッグ リンデロン 2A	30分	点滴		Day8
⑤	生理食塩水100mL ガスター 1A	30分	点滴		
⑥	5% ブドウ糖液 500mL パクリタキセル 175mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	180分	点滴	フィルター使用	
⑦	生理食塩液 100mL ジェムザール 1250mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	30分	点滴		


投与手順
【Day1】



【Day 8】



スケジュール



注意

減量・休薬・投与延期の基準

好中球数	G3以上の好中球減少性発熱症
血小板数	25,000/mm ³ 未満の血小板数減少、または血小板輸血を行った場合
非血液毒性	G3以上の非血液毒性(悪心・嘔吐、食欲不振を除く)

治療成績

(国内第Ⅱ相) (海外第Ⅲ相)

奏効率	44.60%	41.40%
1年生存率	78.60%	-
OS	生存例多数のため推定できず	18.6M
TTP	6.80M	5.49M
PFS	-	5.32M

副作用

	発現率	G3以上の発現率
下痢	17.9%	3.6%
食欲不振	46.4%	1.8%
好中球減少症	96.4%	82.1%
感覚障害	23.2%	1.8%
ALT(GPT)増加	75.0%	12.5%
血中Na減少	7.1%	1.8%
血中K減少	16.1%	1.8%

参照文献

ジェムザール適正使用ガイド(乳癌編)