

2011.5.2変更

@PATIENTNAME 様

胆道化療 (TS1 + GEM療法)

2012.6.15改訂


指示者		身長	\$HEIGHT01_Doc	cm	
コース数		体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg	
		体表面積	#VALUE!	m2	(DuBoisの式)

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	ティーエスワン(20mg) ()mg/body 朝()mg 夕()mg #VALUE! 計算値 最小単位20mg 通常初回上限は120mg BSAが大きければ140mgまで増量可	2週間内服 (day1-14)	内服		
②	5%糖液250mL	ルートキープ	点滴		
③	グラニセロン3mg1バッグ リンデロン2mg2A	30分	点滴		
④	ジェムサル1000mg/m2 生食 100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最 小単位10mg	30分	点滴		

投与手順

day1
 ティーエスワン内服開始(2週間服用2週間休薬)



スケジュール



副作用	全毒性	grade3/4
好中球減少	12(80%)	4(27%)
貧血	12(80%)	1(18%)
血小板減少	8(53%)	0
食欲不振	10(67%)	0
悪心・嘔吐	6(40%)	0
便秘	3(20%)	0
下痢	2(13%)	0

N=15