

患者ID:@PATIENTID

2012.5.24作成

@PATIENTNAME 様

乳化療(HER+ドセタキセル補助療法)

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |


| | | |
|------|------------|----|
| 身長 | HEIGHT01_D | cm |
| 体重 | HEIGHT01_D | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 |

(DuBoisの式)


実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| ① | 生食100mL | ルートキープ | 点滴 | |
| ② | グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 2A | 30分 | 点滴 | |
| ③ | 5%糖液250mL ドセタキセル 60mg/m2 ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値 | 60分 | 点滴 | |
| ④ | 生理食塩水250mL ハーセプチン 8mg/kg(初回のみ) ハーセプチン6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降 | 90分 | 点滴 | |

投与手順



スケジュール 3週1回投与する



注意

HER2陽性患者のみ使用可

心エコーで心駆出率50%以上

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意(初回投与の40%に発現、0.3%にアナフィラキシーショック)