

患者ID:@PATIENTID

2009.7.9作成

@PATIENTNAME 様

非小細胞肺化療(トポテシン単剤)

2012.2.8改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m2

(DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day8	day15
①	ヴィーンD	ルートキープ	点滴			
②	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴			
③	5%糖液250mL トポテシン 100mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	90分	点滴			

投与手順



スケジュール



トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)

炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1～4日目)

ウルソ3錠3×4日分(1～4日目)

カマグ1.5g3×4日分(1～4日目)

ロペミン1C1×下痢時

半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

副作用	Grade3/4(%)
白血球減少	26.7/6.7
貧血	20.0/0
悪心嘔吐	13.3/0
下痢	6.7/0
脱毛(G2)	13.3