

患者ID:@PATIENTID

2009.10.15作成

@PATIENTNAME様

大腸化療 (IRIS療法)

2012.2.7改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm	
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg	
体表面積	#VALUE!	m2	(DuBoisの式)

実施印

day1 day15


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day15
①	ティーエスワン80mg/m2 ()mg/body 朝()mg 夕()mg #VALUE! 計算値 最小単位20mg 通常初回上限は120mg BSAが大きければ140mgまで増量可	2週間内服 (day1-14)	内服		
②	グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg2A	30分	点滴		
③	トポテシン100mg/m2 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	90分	点滴		

投与手順


day1

ティーエスワン内服開始(2週間服用2週間休薬)

day1.15



スケジュール



トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)

炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)

ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)

カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)

ロペミン1C1×下痢時

半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

副作用	全毒性
好中球減少	79%
貧血	68%
血小板減少	24%
嘔吐	37%
悪心	82%
下痢	55%

治療成績

奏功率47.2%(CR:0 PR:17 SD:17 PD:2)

小松嘉人(北大腫瘍内科)2006 GI Cancer Symposium