


@PATIENTNAME 様 血液化療 ガザイバ

| | | | | |
|------|-----------|------|------------|---------------|
| 指示者 | @USERNAME | 身長 | HEIGHT01_D | cm |
| コース数 | | 体重 | HEIGHT01_L | kg |
| | | 体表面積 | #VALUE! | m2 (DuBoisの式) |

実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ① | 生理食塩液500mL | ルートキープ | 点滴 | |
| ② | デカドロン注3.3mg6A 生食50mL | 15分 | 点滴 | |
| ③ | ロキソプロフェン 1錠 | | 内服 | |
| ④ | フェキソフェナジン錠 1錠 | | 内服 | |
| ⑤ | 生理食塩液100mL | 60分 | 点滴 | |
| ⑥ | ガザイバ1000mg/body 生食250mL (トータル250mLになるよう調製) ()mg/body | 【初回】 0-30min:12.5mL/h、 30分毎に12.5mL/h ずつ増加、最大 100mL/hまで 【2回目以降】 25mL/hで開始、30分 毎に25mL/hずつ増 加、最大100mL/hま で 流速を上げる際は、 血圧、体温、SPO2を 測定 | 点滴 | フィルター使用 |

投与手順



スケジュール

投与間隔は治療状況により毎週、3週毎、2か月毎のパターンあり