

患者ID:@PATIENTID

2022.2.24作成

@PATIENTNAME 様

食道化療(キイトルーダ+CF)

		身長	HEIGHT01_D	cm					
		体重	HEIGHT01_I	kg					
		体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>					
指示者	@USERNAME								
コース数									
					day1	day2	day3	day4	day5
	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路						
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴						
②	パロセトロン1V ホスアプレピタント1V デカドロン3.3mg 3A 生食100mL	30分	点滴						
③	キイトルーダ200mg 生食50mL ( )mg/body	30分	点滴	フィルター使用					
④	生食100mL デカドロン(3.3mg)3A	30分	点滴						
⑤	生理食塩水1000mL 5FU 800mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	24時間	点滴						
⑥	ソルデム1 500mLmL 硫酸マグネシウム8mL KCL10mL(0.5A)	1時間	点滴						
⑦	マンニトールS200mL(1Vから100mL捨てて)	30分	点滴						
⑧	生理食塩水250mL ランダ 80mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴						
⑨	ソルデム1 500mL KCL注10mL(0.5A)	1時間	点滴						

朝食前体重が開始前比+2kg でフロセミド注0.5A 静注を検討

投与手順



