

患者ID:@PATIENTID

2020.4.18作成

@PATIENTNAME 様 大腸化療(ザルトラップ[®]+FOLFIRI)

2022.5.12改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセロン3mgバッグ1V デカドロン3.3mg2A プリンペラン1A	30分	点滴	
②	生理食塩水100mL ザルトラップ 4mg/kg ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用
③	トポテシン 150mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	90分	点滴	
④	レボホリナート 200mg/m ² 5%糖液100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑤	5FU 400mg/m ² ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	5分	点滴	
⑥	5FU 2400mg/m ² +生食を加え全量を230mL (処方生食500mL) ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	46時間 インフューザー ポンプで	点滴	

内服

トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠×1日分(1日目)

炭酸水素ナトリウム1.8g×4日分(1~4日目)


ウルソ50mg3錠×4日分(1~4日目)

酸化マグネシウム500mg3錠×4日分(1~4日目)

ロペラミド錠1錠1×下痢時

半夏しや心湯 3P3× 毎食前

投与手順



スケジュール

