

患者ID:@PATIENTID

2019.7.10作成

@PATIENTNAME 様

### 食道化療 (mFOLFOX6)

2022.5.15改訂

|      |           |
|------|-----------|
| 指示者  | @USERNAME |
| コース数 |           |


|      |             |                |
|------|-------------|----------------|
| 身長   | HEIGHT01_Do | cm             |
| 体重   | VHEIGHT01_D | kg             |
| 体表面積 | #VALUE!     | m <sup>2</sup> |

(DuBoisの式)

実施印

|   | 薬物/実際の投与量   | 投与時間 | 投与経路                                     |  |
|---|---|------|--|--|
| ① | グラニセトロン3mgバッグ<br>デカドロン3. 3mg 2A<br>プリンペラン1A   | 30分  | 点滴                                       |  |
| ② | エルプラット85mg/m <sup>2</sup><br>5%糖液250mL<br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値                     | 2時間  | 点滴                                       |  |
| ③ | レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖100mL<br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値                | 2時間  | 点滴                                       |  |
| ④ | 5FU 400mg/m <sup>2</sup><br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値                                   | 5分   | 静注                                       |  |
| ⑤ | 5FU 2400mg/m <sup>2</sup><br>+生食を加え全量を230mL<br>(処方生食500mL)<br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値 | 46時間 | インフューザー<br>ポンプLV5に<br>入れて全量を<br>230mLに調製 |  |

#### 投与手順



#### 注意

5%糖液以外でエルプラットは分解されやすい。  
スケジュール

