患者ID:@PATIENTID 2012.11.15作成

@PATIENTNAME **様**


乳化療AT

| 指示者 | @USERNAME |
|------|-----------|
| コース数 | |

| 身長 | HEIGHT01_Do | cm | |
|------|-------------|----|------------|
| 体重 | /HEIGHT01_D | kg | |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 | (DuBoisの式) |

| | _ | _ |
|-------------|---|---|
| 実施 | _ | r |
| | _ | П |
| | | |

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|-----|---|--------|------|---------------|
| 1 | ヴィーンF | ルートキープ | 点滴 | |
| 2 | アロキシ1V デカドロン3.3mg <u>3A</u> 生食100mL | 30分 | 点滴 | |
| 3 | 生理食塩水50mL アドリアシン60mg/m2 ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値 | 15分 | 点滴 | |
| 4 | 5%糖液250mL ドセタキセル注 75mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 | 60分 | 点滴 | |
| (5) | イメンドセット1セット(day1−3に服用) | | 内服 | day1−3に服 用 |
| 6 | デカドロン錠8錠2×朝昼食後 (day2−4に服用) | | 内服 | day2-4に服 用 |



血管外漏出に注意 アドリアシンの安全な総投与量は450mg/m2