


患者ID:@PATIENTID


2013.2.12作成

@PATIENTNAME 様 乳化療(パクリタキセル+Bev)

指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm		
コース数		体重	HEIGHT01_D	kg		
		体表面積	#VALUE!	m2	(DuBoisの式)	
					実施印	
					day1	day8
					day15	
	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路			
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴			
②	レスタミンコーワ5錠		内服			
③	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 3A	30分	点滴			
④	生理食塩水100mL ガスター 1A	30分	点滴			
⑤	5%糖液250mL パクリタキセル 90mg/m2 ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用	フィルター使用	フィルター使用
	ルートキープの生食でフラッシュ	生食フラッシュ	生食フラッシュ			
⑥	生理食塩水100mL アバスタチン 10mg/kg ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	1回目90分 2回目60分 3回目以降 30分	点滴			



スケジュール  
毎週1回投与する



注意

出血、消化管穿孔、蛋白尿、高血圧、しびれに注意  
パクリタキセルはアルコール入り、フィルターを通して投与  
アバスチン投与日には検尿実施

治療成績

Bev+PTX vs PTX (E2100:海外第3相試験)

PFS	11.3ヶ月 vs 5.8ヶ月
奏効率	49.8% vs 22.2%
OS	26.5ヶ月 vs 24.8ヶ月

JO19901(国内臨床試験)

PFS	12.9ヶ月
奏効率	73.50%