

患者ID:@PATIENTID

2009.4.22作成

@PATIENTNAME 様

胃化療 (TS1+パクリタキセル療法)

2012.2.6改定

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm	
体重	\$WEIGHT01_Doc	kg	
体表面積	#VALUE!	m2	(DuBois式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day15
①	ティーエスワン80mg/m2 ()mg/body 朝()mg 夕()mg #VALUE! 計算値 最小単位20mg 通常初回上限は120mg BSAが大きければ140mgまで増量可	2週間内服 (day1-14)	内服	TS1服用開始 (2週間服用2週間休み)	
②	ヴィーンD500mL	ルートキープ	点滴		
③	レスタミンコーワ錠 5錠		内服		
④	グラニセトン3mg1バッグ デカドロン3.3mg5A	30分	点滴		
⑤	ガスター1A 生理食塩水100mL	30分	点滴		
⑥	5%糖液250mL パクリタキセル100mg/m2 ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	1時間	点滴 ポンプでは時間内に終了しない為、 自然適下で要観察	フィルター使用	フィルター使用


day1

ティーエスワン内服開始(2週間服用2週間休薬)

day1,15



スケジュール



注意

- ・①は2週間投与し、2週間休薬する。
- ・④⑤は同時に投与し、投与後30分経過した後に⑥を投与する。
- ・③④⑤はパクリタキセルの副作用予防目的で投与する。また、しびれがでる際は牛車腎気丸やアズレミンを投与する。
- ・⑥は、副作用の程度により、投与量の変更が必要
- ・⑥にアルコールが含まれており、アルコール過敏症の患者には注意が必要。
- ・DEHPフリーの点滴セット及び、メンブランフィルターを使用すること。
- ・パクリタキセルは粘性があるため、投与時はポンプを1.5倍の速度で投与すると良いとされている。

(臨床成績)・・・鹿児島大学医学部第一外科より (n = 5)

PR : 3
MR : 1
PD : 1

コスト
1回(TXL130mg)注射薬価：
72.416円
1回分の注射コスト
TS-1(100mg)の1クール(2
週投与)薬価：51.352円