



@PATIENTNAME 様 肺化療(テセントリク+アバスチン+カルボプラチン+パクリタキセル)

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBois式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生食500mL	ルートキープ	点滴	
②	レスタミンコーワ 5錠		[内服]	
③	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3.3mg 5A ファモチジン注20mg 1A	30分	点滴	
④	テセントリク注1200mg 生理食塩水 250mL	初回は60分 2回目以降は30分でも良い	点滴	
⑤	アバスチン 15mg/kg+生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	
⑥	パクリタキセル 200mg/m ² 5%糖液 500mL ()mg/body #VALUE! 計算値	3時間	点滴	
⑦	パラプラチン AUC=6/body 生食 250mL ()mg/body 電子カルテで計算	1時間	点滴	



注意

扁平上皮癌には使用不可
 喀血(2.5mL以上の鮮血)の既往のある患者は禁忌

副作用

高血圧、タンパク尿、血栓塞栓症、出血、消化管穿孔、ショック、創傷治癒遅延