

患者ID:@PATIENTID

2017.9.13作成

@PATIENTNAME 様

胃化療(S1+サイラムザ)

2018.2.14改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_Dc	cm	
体重	HEIGHT01_D	kg	
体表面積	#VALUE!	m2	(DuBoisの式)

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day15	day29
①	エスワン80mg/m2 ()mg/body 朝()mg 夕()mg #VALUE! 計算値 最小単位20mg 通常初回上限は120mg BSAが大きければ140mgまで増量可	4週間内服 (day1-28)	内服	day1 夕からS1服用開始 (4週間服用2週間休み)		
②	生理食塩水100mL	ルートキープ	点滴			
③	レスタミンコーワ5錠		内服			
④	生理食塩水250mL サイラムザ 8mg/kg ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用	フィルター使用	フィルター使用

投与手順


day1

day1 夕よりエスワン内服開始(4週間服用2週間休薬)

day1,15,29



スケジュール



注意

Infusion Reactionに注意

消化管穿孔、血栓塞栓症、創傷治癒遅延の副作用あり。

高血圧、蛋白尿に注意

KSCC1701に登録する場合は、プロトコールにt適応基準や除外基準等を参照する
70歳以上、HER2陰性等の適応基準やフェニトイン、ワルファリン、NSAIDsや
抗血小板服用患者は除外等の基準がある。