

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |

| | | |
|------|-----------------|----|
| 身長 | \$HEIGHT01_Doc | cm |
| 体重 | \$WHEIGHT01_Doc | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 |

実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------|
| ① | ゼローダ ()mg/body 2× 朝()mg 夕()mg #VALUE! 計算値 最小単位300mg | 2週間内服 (day1-14) | 内服 | ゼローダ服用開始(2週間服用1週間休み) |
| ② | グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg2A | 30分 | 点滴 | |
| ③ | アバスチン 7.5mg/kg+生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg | 初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い | 点滴 | |
| ④ | 5%糖液250mL トポテシン200mg/m2 ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg | 90分 | 点滴 | |

内服・外用


ピドキサール錠 3T3×食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可

投与手順

day1

ゼローダ内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール

