

患者ID:@PATIENTID

2012.6.27作成

@PATIENTNAME 様

臨時 乳化療 (HER+アブラキサン補助療法)

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m2

(DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生食100mL	ルートキープ	点滴	
②	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴	
③	生理食塩液 100mL アブラキサン 260mg/m2 ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	
④	生理食塩水250mL ハーセプチン 8mg/kg (初回のみ) ハーセプチン6mg/kg (2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降	90分	点滴	

投与手順



スケジュール 3週1回投与する



薬価
BSA1.6、体重56kgの場合
初回1日目は45万円
2コース目以降は42万円

注意

*アブラキサンは術前・術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。

副作用(%)	アブラキサン		パクリタキセル	
	全体	grade3以上	全体	grade3以上
白血球減少	71.7	6.6	79.3	11.3
好中球減少	80.1	34.1	82.4	53.2
末梢神経障害	71.2	10.5	55.1	2.2
筋肉痛	26.6	7	29.8	1.3
関節痛	31.9	6.1	30.7	3.1
倦怠感	38.9	6.1	32.4	1.8
悪心	29.3	2.6	20.4	0.4
嘔吐	16.2	2.2	8.4	0.9

HER2陽性患者のみ使用可

心エコーで心駆出率50%以上

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意(初回投与の40%に発現、0.3%にアナフィラキシーショック)