

患者ID:@PATIENTID

2009.10.28作成

@PATIENTNAME 様

食道化療(DCF療法)

2018.4.28改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day2	day3	day4	day5
①	生食500mL 5FU 350mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	24時間	点滴					
②	アロキシ1V デカドロン(3.3mg)3A プロイメンド1V 生食100mL	30分	点滴					
③	5%糖液250mL ドセタキセル 60mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴					
④	生理食塩水100mL ランダ6mg/m ² ()mg/body 最小単位1mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴					
⑤	デカドロン(0.5mg)8錠2×朝昼食後4日分 day2-5		内服					day2-5に服用

投与手順


day1



day2-5



スケジュール



注意

アルコールが含まれているため、アルコール過敏にはドセタキセルをアルコール抜きで調製。
初回より、骨髄抑制の発現頻度が高い。
高頻度の脱毛あるため、事前の説明が必要。