

患者ID:@PATIENTID

@PATIENTNAME 様

大腸化療アバスタチン+mFOLFOXIRI

2019.3.7作成


指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm
コース数		体重	WHEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup> (DuBoisの式)

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	アロキシ1V デカドロン3.3mg3A プロイメンド1V  生理食塩水100mL	30分	点滴	
②	アバスタチン 5mg/kg 生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	点滴	
③	トポテシン 150mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	60分	点滴	
④	エルプラット 85mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑤	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%糖液100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑥	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方生食250mL) ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	46時間 インフューザー ポンプで	点滴	
⑦	デカドロン(0.5mg)8錠2×朝昼食後3日分 day2-4		内服	day2-4に服用

トポテシンの副作用(下痢)が懸念される場合は以下の内服も考慮

- ブスコパン3錠3×1日分(1日目)
- 炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)
- ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)
- カマグ500mg3錠3×4日分(1~4日目)
- ロペラミド錠1錠1×下痢時
- 半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

投与手順



スケジュール

