

患者ID:@PATIENTID

2012.8.3作成

@PATIENTNAME 様


乳化療(Weeklyパクリタキセル+HER+カルボプラチン)

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)
実施印		

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day8	day15	day22
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴				
②	レスタミンコーワ5錠		内服				
③	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 3A	30分	点滴				
④	生理食塩水100mL ガスター 1A	30分	点滴				
⑤	5%糖液250mL パクリタキセル 80mg/m2 ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用	フィルター使用	フィルター使用	
⑥	ソリタT3号 200mL パラプラチン AUC2 ( )mg/body 最小単位10mg 電子カルテにて計算	60分	点滴				
⑦	生理食塩水250mL ハーセプチン 4mg/kg(初回のみ) ハーセプチン 2mg/kg(2回目以降) ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降	90分 2回目から30分	点滴				

投与手順



スケジュール  
毎週1回投与する



注意

HER2陽性患者のみ使用可

心エコーで心駆出率50%以上

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意(初回投与の40%に発現、0.3%にアナフィラキシーショック)

パクリタキセル使用時には必ず、フィルターを使用する。

パクリタキセルはアルコールが入っているため、車の運転は控える。