

患者ID:@PATIENTID

2009.10.13作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療 (アバ<sup>ス</sup>チン+XELOX療法)

2012.4.24改訂

|      |           |
|------|-----------|
| 指示者  | @USERNAME |
| コース数 |           |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 身長   | \$HEIGHT01_Doc | cm |
| 体重   | \$WEIGHT01_Doc | kg |
| 体表面積 | #VALUE!        | m2 |

実施印

|   | 薬物/実際の投与量  | 投与時間                                   | 投与経路 |                      |
|---|--|--|------|----------------------|
| ① | ゼローダ<br>( )mg/body 2×<br>朝( )mg<br>夕( )mg<br>#VALUE! 計算値<br>最小単位300mg        | 2週間内服<br>(day1-14)                     | 内服   | ゼローダ服用開始(2週間服用1週間休み) |
| ② | グラニセトン3mg1バッグ<br>デカドロン3.3mg2A  | 30分                                    | 点滴   |                      |
| ③ | アバ <sup>ス</sup> チン 7.5mg/kg+生食100mL<br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値<br>最小単位10mg | 初回は90分<br>2回目は60分でも良い<br>3回目以降は30分でも良い | 点滴   |                      |
| ④ | 5%糖液500mL<br>エルプラット130mg/m2<br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値<br>最小単位10mg         | 2時間                                    | 点滴   |                      |

**内服・外用**


リン酸ピリドキサル錠 3T3×食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可


**投与手順**

day1

ゼローダ内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール



ゼローダの投与方法

| 体表面積         | 1回服用量  | 1日量    |
|--------------|--------|--------|
| 1.36未満       | 1200mg | 2400mg |
| 1.36以上1.66未満 | 1500mg | 3000mg |
| 1.66以上1.96未満 | 1800mg | 3600mg |
| 1.96以上       | 2100mg | 4200mg |

ゼローダの減量投与方法

| 体表面積         | 1段階減量  |        | 2段階減量  |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
|              | 1回服用量  | 1日量    | 1回服用量  | 1日量    |
| 1.41未満       | 900mg  | 1800mg | 600mg  | 1200mg |
| 1.41以上1.51未満 | 1200mg | 2400mg |        |        |
| 1.51以上1.81未満 | 1500mg | 3000mg | 900mg  | 1800mg |
| 1.81以上2.11未満 |        |        | 1200mg | 2400mg |
| 2.11以上       |        |        |        |        |

n=353

| 副作用 (%) | grade1 | grade2 | grade3 | grade4 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 好中球減少   | <1     | 12     | 7      | <1     |
| 下痢      | 21     | 20     | 20     | 1      |
| 悪心      | 36     | 24     | 7      | 0      |
| 嘔吐      | 24     | 18     | 6      | 0      |
| 口内炎     | 21     | 6      | 2      | 0      |
| HFS     | 14     | 14     | 12     | -      |
| 疲労      | 17     | 14     | 7      | <1     |
| 感覚異常    | 23     | 10     | 5      | 0      |
| 末梢神経障害  | 10     | 6      | 2      | 0      |

NO16966試験

臨床成績

MST

XELOX+AVA(21.6ヶ月ヶ月) vs FOLFOX4+AVA(21.0ヶ月)

HR:0.95