

@PATIENTNAME 様

大腸化療アバスタチン+XELOXアレルギーレジメン

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m2

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	ゼローダ ( )mg/body 2× 朝( )mg 夕( )mg #VALUE! 計算値 最小単位300mg 下記参照	2週間内服 (day1-14)	内服	ゼローダ服用開始(2週間服用1週間休み)
②	グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg5A	30分	点滴	
③	ポララミン注1A 生食50mL	15分	点滴	
④	アバスタチン 7.5mg/kg+生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	
⑤	5%糖液500mL エルプラット130mg/m2 ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	4時間	点滴	

内服・外用


ピドキサル錠 3T3×食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可



投与手順

day1

ゼローダ内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール



ゼローダの投与方法

体表面積	1回服用量	1日量
1.36未満	1200mg	2400mg
1.36以上1.66未満	1500mg	3000mg
1.66以上1.96未満	1800mg	3600mg
1.96以上	2100mg	4200mg

ゼローダの減量投与方法

体表面積	1段階減量		2段階減量	
	1回服用量	1日量	1回服用量	1日量
1.41未満	900mg	1800mg	600mg	1200mg
1.41以上1.51未満	1200mg	2400mg		
1.51以上1.81未満			900mg	1800mg
1.81以上2.11未満	1500mg	3000mg	1200mg	2400mg
2.11以上				

n=311

副作用 (%)	grade1	grade2	grade3	grade4
好中球減少	<1	13	5	0
下痢	20	17	19	<1
悪心/嘔吐	56	40	7	0
口内炎	9	4	<1	-
HFS	8	11	4	-
疲労	17	17	7	-
感覚異常	24	5	4	-
末梢神経障害	7	5	<1	-

NO16967試験

臨床成績

MST

XELOX(18.8ヶ月) vs FOLFOX4(17.7ヶ月)

HR:0.87