


指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm
コース数		体重	HEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m ² (DuBois式)


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day2	day3	day8	day15
①	ソリタT3号 500mL 3本	100mL/hr	点滴					
②	グラニセロン3mg/バッグ デカドロン3.3mg 3A	30分	点滴					
③	トポテシン 60mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	90分	点滴					
④	ランダ 80mg/m ² 生食500mL ()mg/body #VALUE! 計算値	120分	点滴					
⑤	イメドセット1セット	1セットをday1~3で	内服					
⑥	デカドロン(0.5mg)8錠2×朝食後3日分 day2-4		内服		day2-4に服用			

投与手順


day1




day2, 3



day8, 15



スケジュール



内服

- day2 シンセロン1T1×朝食前1日分
- day1-4 プリンペラン3錠3×毎食前 4日分
- トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加
- ブスコパン3錠3×1日分(1日目)
- 炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)
- ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)
- カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)
- ロペミン1C1×下痢時
- 半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

副作用

- 激しい下痢
- 初回より骨髄抑制の発現が高い