

患者ID:@PATIENTID

2010.11.4作成

@PATIENTNAME 様

乳化療(アブラキサン)


2012.5.24改定

指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm
コース数		体重	HEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m2 (Mostellerの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生食100mL	ルートキープ	点滴	
②	グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg2A	30分	点滴	
②	生食100mL アブラキサン260mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	

投与手順



スケジュール



注意

副作用(%)	アブラキサン		パクリタキセル	
	全体	grade3以上	全体	grade3以上
白血球減少	71.7	6.6	79.3	11.3
好中球減少	80.1	34.1	82.4	53.2
末梢神経障害	71.2	10.5	55.1	2.2
筋肉痛	26.6	7	29.8	1.3
関節痛	31.9	6.1	30.7	3.1
倦怠感	38.9	6.1	32.4	1.8
悪心	29.3	2.6	20.4	0.4
嘔吐	16.2	2.2	8.4	0.9

治療成績

CA012-0試験

アブラキサン260mg/m2を3週ごと VS パクリタキセルを175mg/m2を3週ごと

