



指示者	@USERNAME	身長	\$HEIGHT01_Doc	cm	
コース数		体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg	
		体表面積	#VALUE!	m ²	(DuBois式)
					実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	パンビタン末 1g 1×朝食後	連日内服	内服 アリムタ投与1週間前から 連日内服、アリムタ最終投 与から22日まで連日内服		
②	フレズミンS注 1A	9週間ごと	筋注 アリムタ最終投与から22日ま で9週ごとに投与		
③	生理食塩水 500mL 1V	ルートキープ	点滴		
④	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴		
⑤	アバスチン15mg/kg+生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも 良い	点滴		
⑥	アリムタ 500mg/m ² 生食 100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	12分	ルートキープの生食でフ ラッシュ後 点滴		

投与手順



スケジュール



注意

NSAID服用中の患者は注意が必要。可能ならNSAIDを投与期間は中止。CCr45-79mL/minの患者は半減期が短い薬剤(ロキソニン等)はアリムタ投与2日前から投与後2日まで中止、半減期の長い薬剤(メロキシカム)はアリムタ投与5日前から投与後2日まで中止
アリムタは生理食塩水以外の輸液との配合は不可(生食フラッシュが必要)