

患者ID:@PATIENTID

@PATIENTNAME 様

大腸化療（アバスチン+ゼローダ療法）

2014.10.8作成

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m2

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	ゼローダ ( )mg/body 2× 朝( )mg 夕( )mg #VALUE! 計算値 最小単位300mg	2週間内服 (day1-14)	内服	ゼローダ服用開始(2週間服用1週間休み)
②	アバスチン 7.5mg/kg+生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	

内服・外用


ピドキサール錠 3T3×食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可



投与手順

day1

ゼローダ内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール



ゼローダの投与方法

体表面積	1回服用量	1日量
1.36未満	1200mg	2400mg
1.36以上1.66未満	1500mg	3000mg
1.66以上1.96未満	1800mg	3600mg
1.96以上	2100mg	4200mg

ゼローダの減量投与方法

体表面積	1段階減量		2段階減量	
	1回服用量	1日量	1回服用量	1日量
1.41未満	900mg	1800mg	600mg	1200mg
1.41以上1.51未満	1200mg	2400mg		
1.51以上1.81未満			1500mg	3000mg
1.81以上2.11未満	1200mg	2400mg		
2.11以上			1500mg	3000mg

臨床成績

CR:2% PR:17% SD:55%

AVEX試験

HR:0.79

<安全性>

有害事象	ゼローダ+アバスチン群(n=134) n(%)		ゼローダ群(n=136) n(%)	
	Grade 3	Grade 4以上	Grade 3	Grade 4以上
アバスチンに特徴的な有害事象				
出血	0	0	0	1(1)
高血圧	3(2)	0	2(1)	0
静脈血栓塞栓イベント	3(2)	8(6)	4(3)	2(1)
蛋白尿	2(1)	0	0	0
動脈血栓塞栓イベント	2(1)	3(2)	1(1)	0
創傷治癒遅延	0	0	0	0
肺出血、咯血	0	0	1(1)	0
うつ血性心不全	0	0	0	1(1)
瘻孔	0	0	0	0
消化管穿孔	0	0	0	0
可逆性後白質脳症症候群	0	0	0	0
ゼローダに特徴的な有害事象				
手足症候群	21(16)	0	9(7)	0
下痢	8(6)	1(1)	7(5)	2(1)
無力症	6(4)	1(1)	4(3)	1(1)
疲労	4(3)	1(1)	1(1)	0
悪心	1(1)	0	0	0
嘔吐	3(2)	0	2(1)	0
口内炎	0	0	1(1)	0
好中球減少	0	1(1)	1(1)	0

Cunningham D, et al. Lancet Oncol 14:1077-1085, 2013