

患者ID:@PATIENTID

2009.8.6作成

@PATIENTNAME 様

膀胱化療GEM+CDDP(4week)

2013.5.27改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_Dc	cm
体重	HEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day2	day8	day15
①	5%糖液250mL	ルートキープ	点滴				
②	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 1A	30分	点滴				
③	生理食塩水100mL ジェムザール1000mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	30分	点滴				
④	VeenD500mL	100mL/hr	点滴				
⑤	ソルデム500mL	100mL/hr	点滴				
⑥	VeenD500mL	100mL/hr	点滴				
⑦	アロキシ1V+生理食塩水100mL デカドロン3.3mg3A	30分	点滴				
⑧	生理食塩水250mL ランダ 70mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴				
⑨	ソルデム500mL	100mL/hr	点滴				
⑩	VeenD500mL	100mL/hr	点滴				
⑪	ソルデム500mL	100mL/hr	点滴				

投与手順


day1




day2



day8
day1,15





注意

間質性肺炎(1.5%)に注意、ジェムザールには皮疹が10%程度あり。
 day8においてはWBC2000/ μ L以下、血小板7万/ μ L以下が休薬基準となる。
 吐き気が強いときは、イメンド追加を考慮。またはプリンペラン注投与。

治療成績

MST13.8ヶ月(M-VAC14.8ヶ月:有意差なし)
 奏効率 49.4%(M-VACは45.7%:有意差なし)
 癌化学療法ハンドブック2009p320より