

患者ID:@PATIENTID

2010.10.8作成

@PATIENTNAME 様

頭頸部化療(DCF療法ショートハイト・レーション・プロイメント) 2018.4.28改定


指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm
コース数		体重	HEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day2	day3	day4	day5
①	生食1000mL 5FU 750mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	24時間	点滴					
②	アロキシ1V プロイメント1V デカドロン(3.3mg)3A 生食100mL	30分	点滴					
③	5%糖液250mL ドセタキセル 75mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴					
④	ソルデム1 500mL 硫酸マグネシウム8mL KCL10mL(0.5A)	1時間	点滴					
⑤	マンニトール200mL(1Vから100mL捨てて)	30分	点滴					
⑥	生理食塩水500mL ランダ 75mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴					
⑦	ソルデム1 500mL KCL注10mL(0.5A)	1時間	点滴					
⑧	デカドロン(0.5mg)8錠2×朝食後4日分 day2-5		内服					day2-5に服用

投与手順


day1



day2-5



スケジュール



注意

ドセタキセルにはアルコールが含まれている。
初回より、骨髄抑制の発現頻度が高い。
高頻度の脱毛があるため、事前の説明が必要。