

患者ID:@PATIENTID

2009.10.27作成

@PATIENTNAME 様 肺化療(トポテシン+パラプラチン)


2012.11.21改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm	
体重	HEIGHT01_D	kg	
体表面積	#VALUE!	m ²	(DuBois式)
年齢		歳	
性別			
血清クレアチニン		mg/dL	
Ccr		mL/min	(Cockcroft&Gault式(+0.2補正))

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day8	day15
①	ソリタT3号 500mL	ルートキープ	点滴			
②	グラニセトロン3mg/バッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴			
③	トポテシン 50mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	90分	点滴			
④	パラプラチン AUC5 生食 250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	60分	点滴			


投与手順
day1



day8、15



スケジュール



内服

トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)

炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1～4日目)

ウルソ3錠3×4日分(1～4日目)

カマグ1.5g3×4日分(1～4日目)

ロペミン1C1×下痢時

半夏しゃ心湯 3P3× 毎食前

副作用

激しい下痢

初回より骨髄抑制の発現が高い