

@PATIENTNAME 様

乳化療(パージェタ+ハーセプチン)

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |


| | | |
|------|------------|----|
| 身長 | HEIGHT01_D | cm |
| 体重 | HEIGHT01_D | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 |

(DuBoisの式)

実施印


| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|---|------------------------------|------|--|
| ① | 生理食塩水100mL | ルートキープ | 点滴 | |
| ② | 生理食塩液100mL デカドロン3.3mg 2A | 30分 | 点滴 | |
| ③ | 生理食塩液250mL パージェタ点滴静注 420mg/body (2回目以降) ()mg/body | 2回目以降30分 (問題ある場合は 1時間) | 点滴 | |
| ④ | 生理食塩水250mL ハーセプチン 6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 2回目以降 | 2回目以降30分 (問題ある場合は 90分) | 点滴 | |

投与手順



スケジュール

3週ごと投与する



注意

HER2陽性患者のみ使用可

| | |
|------|---|
| 選択基準 | ベースラインのLVEF ≥ 50% |
| 除外基準 | コントロール不良の高血圧 (Bp150/100以上) 不安定狭心症 うっ血性心不全の既往 治療を要する重篤な不整脈(心房細動、発作性上室性頻脈を除く) 6か月以内の心筋梗塞 術前/術後療法でのハーセプチン投与中または投与後にLVEF < 50% |

パージェタ、ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意

| | パージェタ+H+D | | プラセボ+H+D | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Infusion reaction | 全grade | grade 3-5 | 全grade | grade 3-5 |
| 発現率 | 13.8% | 0.3% | 15.4% | 1.0% |