

患者ID:@PATIENTID

2011.8.12作成

@PATIENTNAME 様

乳化療(ハラヴェン)

2012.5.24改定

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |


| | | |
|------|------------|----|
| 身長 | HEIGHT01_D | cm |
| 体重 | HEIGHT01_D | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 |

(DuBoisの式)


実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | day1 | day8 |
|---|--|--------|-------|------|------|
| ① | 生食100mL | ルートキープ | 点滴 | | |
| ② | グラニセトロン3mg 1バッグ | 30分 | 点滴 | | |
| ③ | キープの生食でルートフラッシュ | フラッシュ | フラッシュ | | |
| ④ | 生食20mL ハラヴェン1.4mg/m2 ()mg/body #VALUE! 計算値 | 2~5分 | 静注 | | |

投与手順



スケジュール



注意

ハラヴェンは生食以外の配合は不可

BSA: 1.6
薬価: ¥190,000

効果

アンスサイクリン系及びタキサン系を含む前治療歴を有する進行再発乳がん患者への国内第II相試験 奏効率:21.3%

副作用

悪心42% 脱毛58% 白血球減少98.8% 末梢神経障害24.7% 疲労44.4% 口内炎38.3% 味覚異常33.3% FN13.6% 発疹11.1%