


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_Dc	cm	
体重	WEIGHT01_D	kg	
体表面積	#VALUE!	m ²	(DuBois式)
年齢		歳	
性別			
血清クレアチニン		mg/dL	
Ccr		mL/min	(Cockcroft&Gault式(+0.2補正))


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生食500mL	ルートキープ	点滴	
②	レスタミンコーワ 5錠		[内服]	
③	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3.3mg 5A	30分	点滴	
④	ガスター20mg 1A 生理食塩水 100mL	30分	点滴	
⑤	アバスチン 15mg/kg+生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	
⑥	パクリタキセル 210mg/m ² 5%糖液 500mL ()mg/body #VALUE! 計算値	3時間	点滴	
⑦	パラプラチン AUC=6/body 生食 250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	1時間	点滴	

投与手順



スケジュール



注意

扁平上皮癌には使用不可
喀血(2.5mL以上の鮮血)の既往のある患者は禁忌

副作用

高血圧、タンパク尿、血栓塞栓症、出血、消化管穿孔、ショック、創傷治癒遅延