

患者ID:@PATIENTID

2014.1.17作成

@PATIENTNAME 様


胃化療(Weeklyパクリタキセル+HER)

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm	
体重	HEIGHT01_D	kg	
体表面積	#VALUE!	m2	(DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day8	day15
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴			
②	レスタミンコーワ5錠		内服			
③	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 3A	30分	点滴			
④	生理食塩水100mL ガスター 1A	30分	点滴			
⑤	5%糖液250mL パクリタキセル 80mg/m2 ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用	フィルター使用	フィルター使用
⑥	生理食塩水250mL ハーセプチン 8mg/kg(初回のみ) ハーセプチン 6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 (0) 2回目以降	90分 2回目から30分	点滴			



スケジュール
毎週1回投与する



注意

HER2陽性患者のみ使用可

心エコーで心駆出率50%以上

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意

ハーセプチン投与中はInfusion reactionに注意(初回投与の40%に発現、0.3%にアナフィラキシーショック)

パクリタキセル使用時には必ず、フィルターを使用する。

パクリタキセルはアルコールが入っているため、車の運転は控える。

治療成績

奏効率は37%(JFMC45-1102試験:トラスツズマブ未治療の2次治療)