

| | | | | |
|------|-----------|------|----------------|----|
| 指示者 | @USERNAME | 身長 | \$HEIGHT01_Doc | cm |
| コース数 | | 体重 | \$WEIGHT01_Doc | kg |
| | | 体表面積 | #VALUE! | m2 |

実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|--|--------------------|------|----------------------|
| ① | ゼローダ ()mg/body 2× 朝()mg 夕()mg #VALUE! 計算値 最小単位300mg 下記参照 | 2週間内服 (day1-14) | 内服 | ゼローダ服用開始(2週間服用1週間休み) |
| ② | グラニセトロン3mg1バッグ | 30分 | 点滴 | |
| ③ | 5%糖液500mL エルプラット130mg/m2 デカドロン3.3mg2A ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg | 2時間 | 点滴 | |

内服・外用

ピドキサル錠 3T3×食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可


投与手順

day1

ゼローダ内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール



ゼローダの投与方法

| 体表面積 | 1回服用量 | 1日量 |
|--------------|--------|--------|
| 1.36未満 | 1200mg | 2400mg |
| 1.36以上1.66未満 | 1500mg | 3000mg |
| 1.66以上1.96未満 | 1800mg | 3600mg |
| 1.96以上 | 2100mg | 4200mg |

ゼローダの減量投与方法

| 体表面積 | 1段階減量 | | 2段階減量 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1回服用量 | 1日量 | 1回服用量 | 1日量 |
| 1.41未満 | 900mg | 1800mg | 600mg | 1200mg |
| 1.41以上1.51未満 | 1200mg | 2400mg | 900mg | 1800mg |
| 1.51以上1.81未満 | | | | |
| 1.81以上2.11未満 | 1500mg | 3000mg | 1200mg | 2400mg |
| 2.11以上 | | | | |