

患者ID:@PATIENTID

2008.1.13作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療(mFOLFOX6)

2022.5.12改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_Do	cm
体重	VHEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

開始時体重 kg  
(DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3. 3mg 2A プリンペラン1A	30分	点滴	
②	エルプラット85mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	2時間	点滴	
③	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	2時間	点滴	
④	5FU 400mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body #VALUE! 計算値	5分	静注	
⑤	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方生食500mL) ( )mg/body #VALUE! 計算値	46時間	インフューザー ポンプLV5に 入れて全量を 230mLに調製	

### 投与手順



### 注意

5%糖液以外でエルプラットは分解されやすい。


### 副作用

末梢神経症状 82% (機能障害に至ったもの19%) 投与を重ねるごとに増していく。

白血球、好中球減少 85%

下痢56%、悪心71%、脱毛38%、疲労70%、口内炎38%

### スケジュール



### 効果

#### mFOLFOX6

TREE1試験

1stlineで奏効率43%

MST19.2ヶ月