


@PATIENTNAME 様 血液化療 ダラキューロ

|      |           |      |            |               |
|------|-----------|------|------------|---------------|
| 指示者  | @USERNAME | 身長   | HEIGHT01_D | cm            |
| コース数 |           | 体重   | HEIGHT01_L | kg            |
|      |           | 体表面積 | #VALUE!    | m2 (DuBoisの式) |

実施印

|   | 薬物/実際の投与量               | 投与時間   | 投与経路 |                                  |
|---|-------------------------|--------|------|----------------------------------|
| ① | 生理食塩液100mL              | ルートキープ | 点滴   |                                  |
| ② | コロナール錠300g3錠            |        | 内服   |                                  |
| ③ | モンテルカスト10mg 1錠          |        | 内服   |                                  |
| ④ | デカドロン注3.3mg6A<br>生食50mL | 15分    | 点滴   |                                  |
| ⑤ | ボラミン注1A<br>生食50mL       | 15分    | 点滴   |                                  |
| ⑥ | ルートを外して1時間経過観察          |        | 経過観察 |                                  |
| ⑦ | ダラキューロ配合皮下注1800mg       | 3~5分   | 皮下注  | 臍から右または左に約7.5cmの腹部皮下に3-5分かけて皮下投与 |
| ⑧ | レプラミドカプセル5mg            |        | 内服   | day1-21内服予定                      |



スケジュール

投与間隔は治療状況により毎週、2週毎、4週毎のパターンあり