

患者ID:@PATIENTID

2015.6.3作成

@PATIENTNAME様

胃化療(サイラムザ)

2021.3.8改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	WEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

(DuBoisの式)


実施印

day1 day15

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生理食塩水100mL	ルートキープ	点滴		
②	レスタミンコーウ5錠		内服		
⑤	生理食塩水250mL サイラムザ 8mg/kg ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分 (2回目以降 30分可)	点滴	フィルター使 用	フィルター使 用



スケジュール



注意

Infusion Reactionに注意

消化管穿孔、血栓塞栓症、創傷治癒遅延の副作用あり。


高血圧、蛋白尿に注意

治療成績

REGARD試験

OS Ram vs BSC 5.2ヶ月 vs 3.8ヶ月
PFS Ram vs BSC 2.1ヶ月 vs 1.3ヶ月

〔尿蛋白検査及び蛋白尿発現時の対処方法〕



● Infusion reaction 発現時の対処方法

サイラムザ投与により infusion reaction があらわれた場合には、副作用の症状、程度に応じて以下の対処方法を考慮してください。

(Infusion reaction 発現時のサイラムザの対処方法)

