

患者ID:@PATIENTID

2010.6.25作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療(ベクティビックス+FOLFIRI)

2024.1.11改訂


| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |

| | | |
|------|-------------|----------------|
| 身長 | HEIGHT01_Do | cm |
| 体重 | VHEIGHT01_D | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m ² |

(DuBoisの式)

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|--|-------------------------|------|---------|
| ① | 生理食塩液500mL | ルートキープ | 点滴 | |
| ② | ポララミン注 生食50mL | 15分 | 点滴 | |
| ③ | グラニセトロンバッグ デカドロン3.3mg 2A プリンペラン1A | 30分 | 点滴 | |
| ④ | ベクティビックス 6mg/kg 生食100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 | 60分 | 点滴 | フィルター使用 |
| ⑤ | 生食50mL | 15分 | 点滴 | |
| ⑥ | トポテシン 150mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値 | 90分 | 点滴 | |
| ⑦ | レボホリナート 200mg/m ² 5%糖液100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 | 120分 | 点滴 | |
| ⑧ | 5FU 400mg/m ² ()mg/body #VALUE! 計算値 | 5分 | 点滴 | |
| ⑨ | 5FU 2400mg/m ² +生食を加え全量を230mL (処方は生食500mL) ()mg/body #VALUE! 計算値 | 46時間 インフューザー ポンプで | 点滴 | |


投与手順



注意

ペクティビックスは生食以外との配合はできない。⑤の生食はルート内フラッシュ及び経過観察目的で行う。

スケジュール



トポテシンの副作用（下痢）が懸念される場合は以下の内服も考慮

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)
炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)
ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)
カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)
ロペラミド錠1錠1×下痢時
半夏しゃ心湯 3P3× 每食前

<ペクティビックス単剤>

副作用発現

| | | |
|----------|-----------|--------|
| ざ瘡 65% | 低Mg血症 28% | 下痢 15% |
| 皮膚乾燥 60% | 疲労 26% | 嘔吐 15% |
| 発疹 55% | 口内炎 25% | 紅斑 13% |
| 搔痒 42% | 食欲不振 20% | |
| 爪周囲炎 35% | | |

臨床試験成績(国内第2相試験:20050216試験)

*追跡期間中央値26.1週(5.4-42.0週)

奏効率 13.5%

奏効期間 16.2週

PFS 8.0週

OS 9.3月

V303試験

FOLFIRI VS civ5FU/LV

| | 奏効率 | TTP | MST |
|-----------|--------|-------|--------|
| FOLFIRI | 34.80% | 6.7ヶ月 | 17.4ヶ月 |
| civ5FU/LV | 21.90% | 4.4ヶ月 | 14.1ヶ月 |

化学療法未治療の切除不能転移・再発大腸癌

奏効率 56% (海外)

PFS 8.5ヶ月*

OS 17.4-20.1ヶ月***

※Christophe Tournigand: FOLFIRI Followed by FOLFOX6 or the Reverse Sequence in Advanced Colorectal Cancer; A Randomized GERCOR Study , Journal of Clinical Oncology, Vol22, 2004

※※Alan Venook: Critical Evaluation of Current Treatments in Metastatic Colorectal Cancer, The Oncologist, 2005; 10 : 250-261